

TESTOVÁNÍ POD DOHLEDEM ZUBNÍHO LÉKAŘE. GENGIGEL® FORTE Perio spojuje speciální funkční vlastnosti přípravků GENGIGEL® FORTE s účinky chlorhexidinu uznávanými stomatologickou praxí. Tato řada je určena k podpoře zdraví dásní. Působí pro prevenci tvorby zubního plaku tím, že redukuje bakteriální biofilm a zároveň chrání a zklidňuje citlivé, oslabené dásně a ústní sliznici. Díky kombinovanému účinku kyseliny hyaluronové s vysokou molekulovou hmotností a diglukonátu chlorhexidinu pomáhá předcházet vzniku onemocnění dásní způsobených kumulací biofilmu, hlavního etiologického faktoru parodontálních onemocnění. Přítomnost xylitolu podporuje hydrataci sliznice a proces slinění a zároveň působí proti množení bakterií tím, že omezuje tvorbu biofilmu a plaku a obnovuje přirozené pH dutiny ústní.

CHARAKTERISTIKA FUNKOVÁNÍ.

- Vysoká koncentrace kyseliny hyaluronové s vysokou molekulovou hmotností: hydratační, zklidňující a regenerační účinek na tkáň a sliznici.
- Diglukonát chlorhexidinu: protiplakový a antibakteriální účinek.
- ACC (Anti-Colour Complex): chelatační a antioxidační komplex; omezuje vratnou pigmentaci zubní skloviny způsobenou dlouhodobým používáním přípravků na bázi chlorhexidinu. ÚČINNOST TESTOVÁNA. Ⓢ
- Ascorbyl palmitát: působí proti hyaluronidázové aktivitě a chrání kyselinu hyaluronovou. Ⓢ
- Xylitol: protiplakový a hydratační účinek. PVA a PVP: ochranný účinek tvorbou filmu.
- Polykarbofil a GFC (glycerofosforylcholin): mucoadhezivní účinek. Ⓢ

GENGIGEL® FORTE Perio obsahuje:

Periodontální gel, 8 ml: kyselina hyaluronová 1.2%, diglukonát chlorhexidinu 0.2%.

Periodontální sprej, 20 ml: kyselina hyaluronová 0.05%, diglukonát chlorhexidinu 0.2%.

Ústní roztok, 200 ml: kyselina hyaluronová 0,05%, diglukonát chlorhexidinu 0.2%.

SLOŽENÍ.

Periodontální gel: AQUA, XYLITOL, CELLULOSE GUM, PEG-8, PEG-40 HYDROGENATED CASTOR OIL, SODIUM HYALURONATE, PVP, GLYCEROPHOSPHOCHOLINE, SODIUM BENZOATE, TOCOPHERYL ACETATE, SODIUM PHOSPHATE, CHLORHEXIDINE DIGLUCONATE, POLYVINYL ALCOHOL, AROMA, TRISODIUM PHOSPHATE, LACTIC ACID, SODIUM THIOCTATE, DISODIUM EDTA, SODIUM LACTATE, SODIUM SACCHARIN, ASCORBYL PALMITATE, CARVONE, CITRAL, CITRUS LIMON PEEL OIL, LIMONENE, LINALOOL, LINALYL ACETATE, MENTHA VIRIDIS LEAF OIL, MENTHOL, PINENE.

Periodontální sprej: AQUA, XYLITOL, PEG-40 HYDROGENATED CASTOR OIL, PEG-8, SODIUM BENZOATE, TOCOPHERYL ACETATE, SODIUM PHOSPHATE, CHLORHEXIDINE DIGLUCONATE, AROMA, TRISODIUM PHOSPHATE, SODIUM THIOCTATE, DISODIUM EDTA, SODIUM LACTATE, SODIUM HYALURONATE, PVP, POLYVINYL ALCOHOL, LACTIC ACID, GLYCEROPHOSPHOCHOLINE, ASCORBYL PALMITATE, CARVONE, CITRAL, CITRUS LIMON PEEL OIL, LIMONENE, LINALOOL, LINALYL ACETATE, MENTHA VIRIDIS LEAF OIL, MENTHOL, PINENE.

Ústní roztok: AQUA, XYLITOL, PEG-40 HYDROGENATED CASTOR OIL, SORBITOL, PVP, PEG-8, SODIUM BENZOATE, TOCOPHERYL ACETATE, SODIUM PHOSPHATE, CHLORHEXIDINE DIGLUCONATE, REBAUDIOSIDE A, AROMA, TRISODIUM PHOSPHATE, POLYVINYL ALCOHOL, DISODIUM EDTA, SODIUM LACTATE, SODIUM THIOCTATE, SODIUM HYALURONATE, GLYCEROPHOSPHOCHOLINE, ASCORBYL PALMITATE, C.I. 42090, CARVONE, CITRAL, CITRUS LIMON PEEL OIL, LIMONENE, LINALOOL, LINALYL ACETATE, MENTHA VIRIDIS LEAF OIL, MENTHOL, PINENE.

POKYNY K POUŽITÍ. GENGIGEL® FORTE Perio je indikován ke krátkodobé léčbě a po parodontálních chirurgických zákrocích.

Periodontální gel: Malé množství přípravku nanášíte dvakrát denně po dobu 7 dnů. K aplikaci do mezizubních prostor použijte malé mezizubní kartáček.

Periodontální sprej: Aplikujte 2x denně po dobu 14 dnů.

Ústní roztok: Vyplechujte ústa po dobu nejméně 30 sekund jednou polévkovou lžící neředěného přípravku (10 ml), nejlépe po běžné ústní hygieně. Pokračujte v používání 14 dnů. V případě potřeby delší léčby nebo při projevech přecitlivělosti se poraďte se zubním lékařem.

UPOZORNĚNÍ: Neužívat vnitřně. Nepoužívat do očí ani do uší. Může způsobit: vratné hnědé zbarvení jazyka, zubů nebo zubních náhrad, poruchy chuti; vzácně alergické reakce. Pokud jste těhotná nebo těhotenství plánujete, informujte svého zubního lékaře. Nepoužívejte u dětí mladších 6 let. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nepoužívejte déle, než je uvedeno v návodu k použití, bez konzultace se zubním lékařem. Nevystavujte působení světla nebo zdrojů tepla. Po použití obal zlikvidujte. Obal po použití vždy pečlivě uzavřete.



CG2005-000-00/A v2

www.gengigel.cz

EMPOLAS

Výhradní distributor pro ČR
EMPOLAS s.r.o.
Horní lán 9A, Olomouc 77900
www.empolas.com

UK RP:
Angel Consulting London Ltd
2 Portman Street,
London W1H 6DU, UK

EU RP:
Angel Consulting
Piazza Duca degli Abruzzi 5/4
Genova - IT

RICERFARMA s.r.l.
Via Egadi, 7 - 20144 Milano IT
www.ricerfarma.com
Made in Italy