

OROXID® sensitiv – ústní gel

1. Popis produktu a použití: OROXID® sensitiv je gel obsahující 1,5 % peroxid vodíku používaný k udržení ústní hygieny a zdravých dásní, který pomáhá proti zánětlivým onemocněním v dutině ústní. Je určen pro prevenci a zmírnění zánětů měkkých tkání dutiny ústní, jako jsou podrážděné, zanícené a krvácející dásně. Pomáhá snižovat zánět dásní, parodontitidu a poškození dásní po zákrocích např. po extrakci zubu. Dodržování správné hygieny dutiny ústní je zásadní z důvodu prevence zánětů dásní a jiných zánětlivých onemocnění dutiny ústní. Zánět dásní (gingivitida) je způsoben plakem a bakteriemi.

OROXID® sensitiv díky mechanickým vlastnostem a uvolňování kyslíku ve formě mírného pění, pozitivně ovlivňuje mikroprostředí poškozené sliznice. Proto se doporučuje jako doplněk k ústní hygieně u fixních zubních aparátů, částečných protéz, fixních protetických náhrad (fazety, můstky) a implantátů. Přípravek zlepšuje výsledky ústní hygieny u pacientů s ortodontickými anomáliemi, kvůli kterým je obtížná běžná dentální hygiena. Peroxid vodíku může pomoci předcházet tvorbě plaku, změně barvy zubů a zápachu z úst (halitózy). Také pomáhá snížit usazeniny na jazyku a sliznici úst, obvykle vyvolané přítomností patogenů plísňe, a obnovuje svěží dech. Působí pouze na povrchu, jelikož peroxid vodíku neproniká do hlubších tkání.

OROXID® sensitiv obsahuje pomocnou látku Actipone® PX3 (bylinný extrakt).

Produkt je dostupný ve formě gelu v baleních 15 ml, 30 ml a 50 ml.

2. Použití a dávkování: OROXID® sensitiv používejte dvakrát až třikrát denně, nejlépe po vyčištění zubů. Naneste malé množství gelu OROXID® sensitiv (dvě až tři stlačení) na čistý prst (který je důkladně omytý mýdlem a vodou) nebo na vatovou tyčinku a aplikujte na postižené místo v dutině ústní. Vyčkejte 30 sekund, aby produkt mohl fungovat. Po ošetření vypláchněte ústa vodou a vyplivněte.

OROXID® sensitiv gel používejte pravidelně, dokud se stav nezlepší nebo zánět nezmizí. Pokud se stav nezlepší do 8 týdnů, poradte se s lékařem. Přípravek OROXID® sensitiv není určen k léčení vážných zánětlivých onemocnění v dutině ústní s postižením hlubších tkání, pokud to je Váš případ, poradte se s lékařem. Pro preventivní účely a pro udržení správné ústní hygieny používejte OROXID® sensitiv jednou denně, jak je uvedeno výše. Aplikace gelu může v ústech vyvolat pění, což je pozitivní reakce, která znamená, že je uvolňován aktivní kyslík.

3. Nežádoucí účinky a preventivní opatření: Při aplikaci peroxid vodíku v nízkých koncentracích na sliznici se může zřídka vyskytnout podráždění. V případě hypersenzitivní reakce nebo podráždění, přerušete používání přípravku OROXID® sensitiv. Podráždění je přechodné a odezní po několika minutách nebo po vypláchnutí vodou. OROXID® sensitiv je určen pouze k lokálnímu použití v dutině ústní. Není určen ke konzumaci a po ošetření by se měl vyplivnout. Vyhněte se kontaktu s očima.

Opatření při kontaktu s očima: OROXID® sensitiv může při požití způsobit mírné podráždění sliznice trávicího traktu, které se může projevit např. zvracením a průjmem. Při požití velkého množství gelu nebo pokud zaznamenáte závažné příznaky, poradte se s lékařem.

Vdechnutí: OROXID® forte se při pokojové teplotě téměř neodpařuje, a neprodukuje tudíž významné množství páry peroxidu vodíku. Při zahřívání roztoku se mohou uvolňovat páry, které mohou u citlivých osob způsobit podráždění nosu, krku a dýchacích cest.

Opatření při rozlité obsahu: Neotvírejte nádobu přípravku, aby nedošlo k rozlité. V případě rozlité otřete vylitý obsah a poté si umyjte si ruce.

4. Složení: OROXID® sensitiv gel obsahuje deionizovanou vodu, 1,5 % roztok peroxidu vodíku, Actipone® (PX3 Aqua, glycerin, PEG-40 hydrogenovaný ricinový olej, Zingiber officinale výtažek z kořene, Commiphora Myrrha Resin, extrakt z Echinacea purpurea extrakt), Aristoflex HMB, Sepinov EMT 10, příchutě a stabilizátor.

5. Skladování a trvanlivost: Gel OROXID® sensitiv skladujte při pokojové teplotě mezi 5 °C a 25 °C. Doba použitelnosti přípravku je dva roky. Nepoužívejte přípravek po uplynutí doby použitelnosti. Skladujte mimo dosah přímého slunečního záření. Výrobek používejte pouze v neporušeném obalu. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Dovozca a distribútor ČR a SR: EMPOLAS s.r.o., | Horní lán 9A, Olomouc 77900, Česká republika | info@empolas.com, Tel: +420 775 335 111, www.oxid.cz

OROXID® sensitiv - ústny gél

1. Popis produktu a použitie: OROXID® sensitiv je gél obsahujúci 1,5 % peroxid vodíka používaný na udržanie ústnej hygieny a zdravých ďasien, ktorý pomáha proti zápalovým ochoreniam v dutine ústnej. Je určený na prevenciu a zmiernenie zápalov mäkkých tkanív dutiny ústnej, ako sú podráždené, zapálené a krvácajúce ďasná. Pomáha znižovať zápal ďasien, parodontitídu a poškodenie ďasien po zákrokoch, napr. po extrakcii zuba. Dodržiavanie správnej hygieny dutiny ústnej je zásadné kvôli prevencii zápalov ďasien a iných zápalových ochorení v dutine ústnej. Zápal ďasien (gingivitída) je spôsobený plakom a baktériami.

OROXID® sensitiv vďaka mechanickým vlastnostiam a uvoľňovaniu kyslíka vo forme mierneho penenia pozitívne ovplyvňuje mikroprostredie poškodenej sliznice. Preto sa odporúča ako doplnok k ústnej hygieny pri fixných zubných aparátoch, čiastočných protézach, fixných protetických náhradách (fazety, mostíky) a implantátoch. Prípravok zlepšuje výsledky ústnej hygieny u pacientov s ortodontickými anomáliami, kvôli ktorým je obtiažna bežná dentálna hygiena. Peroxid vodíka môže pomôcť predchádzať tvorbe plaku, zmene farby zubov a zápachu z úst (halitóze). Taktiež pomáha znížiť usadeniny na jazyku a sliznici úst, obvykle vyvolané prítomnosťou patogénov plesní, a obnovuje svieži dych. Pôsobí iba na povrchu, keďže peroxid vodíka nepreniká do hlbších tkanív.

OROXID® sensitiv obsahuje pomocnú látku Actipone® PX3 (bylinný extrakt).

Produkt je dostupný vo forme gélu v baleniach 15 ml, 30 ml a 50 ml.

2. Použitie a dávkovanie: OROXID® sensitiv používajte dvakrát až trikrát denne, najlepšie po vyčistení zubov. Naneste malé množstvo gélu OROXID® sensitiv (dve až tri stlačenia) na čistý prst (ktorý je dôkladne umytý mydlom a vodou) alebo na vatovú tyčinku a aplikujte na postihnuté miesto v dutine ústnej. Počkejte 30 sekúnd, aby produkt mohol pôsobiť. Po ošetrení vypláchnite ústa vodou a vyplujte. OROXID® sensitiv gél používajte pravidelne, kým sa stav nezlepší alebo zápal nezmizne. Ak sa stav nezlepší do 8 týždňov, poraďte sa s lekárom. Prípravok OROXID® sensitiv nie je určený na liečenie vážnych zápalových ochorení v dutine ústnej s postihnutím hlbších tkanív, ak je to váš prípad, poraďte sa s lekárom. Na preventívne účely a na udržanie správnej ústnej hygieny používajte OROXID® sensitiv raz denne, ako je uvedené vyššie. Aplikácia gélu môže v ústach vyvolať penenie, čo je pozitívna reakcia, ktorá znamená, že sa uvoľňuje aktívny kyslík.

3. Nežiaduce účinky a preventívne opatrenia: Pri aplikácii peroxidu vodíka v nízkych koncentráciách na sliznicu sa môže zriedkavo vyskytnúť podráždenie. V prípade hypersenzitívnej reakcie alebo podráždenia prerušte používanie prípravku OROXID® sensitiv. Podráždenie je prechodné a odoznie po niekoľkých minútach alebo po vypláchnutí vodou. OROXID® sensitiv je určený iba na lokálne použitie v dutine ústnej. Nie je určený na konzumáciu a po ošetrení by sa mal vypluť. Vyhnite sa kontaktu s očami.

Opatrenia pri kontakte s očami: Prípravok OROXID® sensitiv môže pri kontakte s očami spôsobiť ich podráždenie, slzenie a rozmazané videnie. Vážne poškodenie je nepravdepodobné. Zasiahnuté oko vypláchnite čistou vodou alebo fyziologickým roztokom. V prípade potreby sa poraďte s lekárom.

Opatrenia pri požití: OROXID® sensitiv môže pri požití spôsobiť mierne podráždenie sliznice tráviaceho traktu, ktoré sa môže prejaviť napr. vracaním a hnačkou. Pri požití veľkého množstva gélu alebo ak zaznamenáte závažné príznaky, poraďte sa s lekárom.

Vdychovanie: OROXID® sensitiv sa pri izbovej teplote takmer neodparuje, a neprodukuje teda významné množstvo pár peroxidu vodíka. Pri zahrievaní roztoku sa môžu uvoľňovať pary, ktoré môžu u citlivých osôb spôsobiť podráždenie nosa, hrdla a dýchacích ciest.

Opatrenia pri rozliatí obsahu: Neotvárajte nádobu prípravku, aby nedošlo k rozliatiu. V prípade rozliatia utrite vyliaty obsah a potom si umyte ruky.

4. Zloženie: OROXID® sensitiv gél obsahuje deionizovanú vodu, 1,5 % roztok peroxidu vodíka, Actipone® (PX3 Aqua, glycerín, PEG-40 hydrogenovaný ricínový olej, Zingiber officinale extrakt z koreňa, Commiphora Myrrha Resin, extrakt z Echinacea purpurea), Aristoflex HMB, Sepinov EMT 10, príchute a stabilizátor.

5. Skladovanie a trvanlivosť: Gél OROXID® sensitiv skladujte pri izbovej teplote medzi 5 °C a 25 °C. Doba použiteľnosti prípravku je dva roky. Nepoužívajte prípravok po uplynutí doby použiteľnosti. Skladujte mimo dosahu priameho slnečného žiarenia. Výrobok používajte iba v neporušenom obale. Uchovávajte mimo dosahu detí.

Dovozca a distribútor ČR a SR: EMPOLAS s.r.o., | Horní lán 9A, Olomouc 77900, Česká republika | info@empolas.com, Tel: +420 775 335 111, www.oxid.cz